
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Οι ενδείξεις για παραπομπή περιλαμβάνουν:

A. ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΑΕΠ

Επείγουσα εισαγωγή σε νοσοκομείο εάν παρατηρείται πριαπισμός (εάν ο ασθενής έχει στύση διάρκειας πέραν των 4 ωρών θα πρέπει να συμβουλευτεί γιατρό).

B. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΣΕ ΕΙ

Η παραπομπή στη δευτεροβάθμια περίθαλψη ενδείκνυται στις περιπτώσεις:

- Ανωμαλιών του πέους (φίμωση, νόσος Peyronie, μετα-πριαπισμός, καρκίνος του πέους).
- Ενδοκρινολογίας (πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής υπογοναδισμός).
- Σοβαρής ψυχικής δυσχέρειας.
- Αναποτελεσματικής φαρμακοθεραπείας πρώτης γραμμής.
- Ψυχογενούς στυτικής δυσλειτουργίας που αντιστέκεται σε φάρμακα πρώτης γραμμής.
- Απαίτησης εξειδικευμένων διαγνωστικών εξετάσεων (για παράδειγμα, μελέτες Doppler πέους, καταγραφή νυχτερινής στυτικής δραστηριότητας).
- Καρδιαγγειακής νόσου μεσαίου ή υψηλού κινδύνου.
- Αντένδειξης σε αναστολείς της 5-φωσφοδιεστεράσης.
- Δια βίου αναμνηστικού στυτικής δυσλειτουργίας.

Πηγή:

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24468580>