

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Η/ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Είναι σημαντικό να αποκλειστεί η ουρολοίμωξη πριν την όποια παραπομπή.

Οι ενδείξεις για παραπομπή περιλαμβάνουν:

A. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΙ

- Γυναίκες με ακράτεια ούρων και που παρουσιάζουν οποιαδήποτε από τα πιο κάτω:
 - Ανεξήγητη μικροσκοπική αιματουρία σε ηλικίες 50 ετών και άνω.
 - Ανεξήγητη ορατή αιματουρία.
 - Υποτροπιάζουσα ή επίμονη ουρολοίμωξη που σχετίζεται με την αιματουρία σε ηλικίες 40 ετών και άνω.
- Πιθανολογούμενος κακοήθης όγκος στην πυελική χώρα.

B. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΣΕ ΕΙ

- Επίμονος πόνος στην ουροδόχο κύστη ή την ουρήθρα.
- Κλινικώς καλοήθεις όγκοι της πυέλου.
- Ακράτεια κοπράνων.
- Πιθανολογούμενη νευρολογική νόσος.
- Συμπτώματα δυσκολίας στην αφόδευση.
- Πιθανολογούμενο ουρογεννητικό συρίγγιο.
- Προηγούμενη χειρουργική αντιμετώπιση ακράτειας.
- Προηγούμενη χειρουργική αντιμετώπιση καρκίνου της πυέλου.
- Προηγούμενη ακτινοθεραπεία πυέλου.
- Εάν μια γυναίκα δεν επιθυμεί να δοκιμάσει μια διαφορετική φαρμακοθεραπεία για την αντιμετώπιση της υπερδραστήριας κύστης – μετά από αποτυχία ή διακοπή της αρχικής φαρμακευτικής αγωγής λόγω παρενεργειών-, αλλά θα ήθελε να λάβει διαφορετική αγωγή.
- Εάν η φαρμακευτική αντιμετώπιση της υπερδραστήριας κύστης δεν είναι επιτυχής.

Πηγή:

NICE (April 2019). Urinary incontinence - The management of urinary incontinence in women.