

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Καρκίνος πρωκτού

Επείγουσα παραπομπή (εντός 2 εβδομάδων) σε Γαστρεντερολόγο ή Γενικό Χειρουργό σε περιπτώσεις με

- Ανεξήγητη μάζα πρωκτού
- Ανεξήγητη εξέλκωση πρωκτού

Ορθοκολικός Καρκίνος

Επείγουσα παραπομπή (εντός 2 εβδομάδων) σε Γαστρεντερολόγο ή Γενικό Χειρουργό σε περιπτώσεις

- Ηλικίας > 40 ετών με ανεξήγητη απώλεια βάρους και κοιλιακό άλγος
- Ηλικίας >50 ετών με ανεξήγητη εντερική αιμορραγία
- Ηλικίας >60 ετών με ένα των πιο κάτω
 - σιδηροπενική αναιμία
 - Ή αλλαγές στις εντερικές συνήθειες
 - Θετικό τεστ ελέγχου αίματος στα κόπρανα (positive Hemoccult-test)
- Κάθε ηλικίας με μάζα στο ορθό ή την κοιλιά
- Ηλικίας <50 ετών με ορθική αιμορραγία σε συνδυασμό με ένα από τα πιο κάτω συμπτώματα
 - Κοιλιακό άλγος
 - Αλλαγές στις εντερικές συνήθειες
 - Απώλεια βάρους
 - Σιδηροπενική αναιμία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: σε ενήλικες χωρίς αίμα στα κόπρανα με συμπτώματα ή σημεία που προκαλούν κλινική ανησυχία παραπομπή για έλεγχο αίματος στα κόπρανα εάν κριθεί ότι μπορεί να επωφεληθούν του ελέγχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:

1. Για ασθενείς διαγνωσμένους με καρκίνο υπό ογκολογική θεραπεία ή παρακολούθηση συστήνεται επικοινωνία με τον θεράποντα ογκολόγο.

-
2. Ασθενείς υπό ογκολογική θεραπεία ή παρακολούθηση (τουλάχιστον μία επίσκεψη στον ογκολόγο εντός 8 μηνών) έχουν δικαίωμα απ' ευθείας πρόσβασης στον θεράποντα ογκολόγο

Βιβλιογραφία:

Rapid Referral Guidelines for Suspected Cancer. A NICE-endorsed summary of the guidelines for suspected cancer (NG12). MacMillan Cancer Support. <https://www.macmillan.org.uk/healthcare-professionals/cancer-pathways/prevention-and-diagnosis/rapid-referral-guidelines>